

適正使用のために重要な情報です。ぜひお読み下さい。

全 星 薬 品 株 式 会 社
全 星 薬 品 工 業 株 式 会 社

クロピドグレル錠 25mg「ZE」 クロピドグレル錠 75mg「ZE」 「使用上の注意」改訂のお知らせ

謹啓 時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。

平素は当社製品に格別のお引き立てを賜り有難うございます。厚く御礼申し上げます。

さて、この度 6 月発売予定品であるクロピドグレル硫酸塩製剤『クロピドグレル錠 25mg「ZE」・クロピドグレル錠 75mg「ZE」』につきまして平成 27 年 4 月 23 日付厚生労働省医薬食品局安全対策課長通知（薬食安第 0423 第 1 号）に基づき添付文書「使用上の注意」が改訂されました。

下記に追加改訂箇所等を記載しますので、ご留意願います。

謹白

記

改訂後	改訂前
<p>【使用上の注意】</p> <p>4. 副作用 変更なし</p> <p>(1) 重大な副作用（頻度不明）</p> <p>1) ~6) 変更なし</p> <p>7) 中毒性表皮壊死融解症（Toxic Epidermal Necrolysis: TEN）、皮膚粘膜眼症候群（Stevens-Johnson 症候群）、多形滲出性紅斑、急性汎発性発疹性膿疱症：中毒性表皮壊死融解症、皮膚粘膜眼症候群、多形滲出性紅斑、急性汎発性発疹性膿疱症があらわれることがあるので、観察を十分に行い、異常が認められた場合には投与を中止し、適切な処置を行うこと。</p> <p>8) ~10) 変更なし</p> <p>(2) その他の副作用 変更なし</p>	<p>【使用上の注意】</p> <p>4. 副作用 省略</p> <p>(1) 重大な副作用（頻度不明）</p> <p>1) ~6) 省略</p> <p>7) 中毒性表皮壊死融解症（Toxic Epidermal Necrolysis: TEN）、皮膚粘膜眼症候群（Stevens-Johnson 症候群）、多形滲出性紅斑：中毒性表皮壊死融解症、皮膚粘膜眼症候群、多形滲出性紅斑があらわれることがあるので、観察を十分に行い、異常が認められた場合には投与を中止し、適切な処置を行うこと。</p> <p>8) ~10) 省略</p> <p>(2) その他の副作用 省略</p>

部：薬食安指示による追加改訂

以上