

適正使用のために重要な情報です。ぜひお読み下さい。

先生

全星薬品株式会社
全星薬品工業株式会社**ジルチアゼム塩酸塩錠 30mg「ZE」**
ジルチアゼム塩酸塩錠 60mg「ZE」
「使用上の注意」改訂のお知らせ

謹啓 時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。

平素は当社製品に格別のお引き立てを賜り有難うございます。厚く御礼申し上げます。

さて、この度ジルチアゼム塩酸塩製剤『ジルチアゼム塩酸塩錠 30mg「ZE」・ジルチアゼム塩酸塩錠 60mg「ZE」』につきまして先発会社の自主改訂に基づき添付文書「使用上の注意」を改訂することになりましたのでお知らせ致します。

ご使用に際しましては下記記載の追加改訂箇所等にご留意頂くようお願い致します。

まずはお知らせ、お願いと共に今後とも倍旧のご高配を賜りますようお願い申し上げます。

改訂後の添付文書情報は弊社ホームページ(<http://www.zenseiyakuhin.co.jp>)並びに独立行政法人医薬品医療機器総合機構ホームページ(<http://www.pmda.go.jp/pnavi-02.html>)でもご覧いただけます。

また、「医薬品安全対策情報 (Drug Safety Update)」No. 247 号 (3 月上旬発送予定) に掲載されます。

謹白

記

改訂後			改訂前		
【使用上の注意】 3. 相互作用 変更なし 併用注意(併用に注意すること)			【使用上の注意】 3. 相互作用 省略 併用注意(併用に注意すること)		
薬剤名等	臨床症状・措置方法	機序・危険因子	薬剤名等	臨床症状・措置方法	機序・危険因子
変更なし			省略		
シロスタゾール	変更なし	これらの薬剤の代謝酵素(チトクローム P450)を阻害することにより、これらの薬剤の血中濃度を上昇させると考えられる。	シロスタゾール	省略	これらの薬剤の代謝酵素(チトクローム P450)を阻害することにより、これらの薬剤の血中濃度を上昇させると考えられる。
アピキサバン	アピキサバンの作用が増強することがある。 定期的に臨床症状を観察し、異常が認められた場合には減量若しくは投与を中止する。		<<記載なし>>		
ビノレルビン酒石酸塩	変更なし		ビノレルビン酒石酸塩	省略	
変更なし			省略		

部：今回追加改訂箇所
以上