

適正使用のために重要な情報です。ぜひお読み下さい。

先生

全星薬品株式会社
全星薬品工業株式会社

ルーク[®]錠 2.5

ルーク[®]錠 5

「使用上の注意」改訂のお知らせ

謹啓 時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。

平素は当社製品に格別のお引き立てを賜り有難うございます。厚く御礼申し上げます。

さて、この度ピソプロロールフマル酸塩製剤「ルーク錠 2.5・ルーク錠 5」につきまして先発会社の自主改訂に基づき添付文書「使用上の注意」を改訂することになりましたのでお知らせ致します。

ご使用に際しましては下記記載の追加改訂箇所等にご留意頂くようお願い致します。

まずはお知らせ、お願いと共に今後とも倍旧のご高配を賜りますようお願い申し上げます。

ここでお知らせした内容は弊社ホームページ(<http://www.zenseiyakuhin.co.jp>)でもご覧いただけます。

また、「医薬品安全対策情報(Drug Safety Update)」No.221号(7月発送予定)に掲載されま

謹白

記

改訂後		改訂前	
【使用上の注意】 4. 副作用 変更なし (1) 重大な副作用 (頻度不明) 変更なし (2) その他の副作用 変更なし		【使用上の注意】 4. 副作用 省略 (1) 重大な副作用 (頻度不明) 省略 (2) その他の副作用 省略	
種類	頻度	種類	頻度不明
循環器	徐脈、心胸比増大、房室ブロック、低血圧、動悸、心房細動、 <u>心室性期外収縮、胸痛</u>	循環器	徐脈、心胸比増大、房室ブロック、低血圧、動悸、心房細動、胸痛
変更なし		省略	
消化器	悪心、嘔吐、胃部不快感、 <u>腹部不快感、食欲不振、下痢</u>	消化器	悪心、嘔吐、胃部不快感、食欲不振、下痢
肝臓	AST(GOT)上昇、ALT(GPT)上昇、 <u>ビリルビン上昇、LDH 上昇、AI-P 上昇、<u>γ-GTP 上昇、肝腫大</u></u>	肝臓	AST(GOT)上昇、ALT(GPT)上昇、 <u>ビリルビン上昇、LDH 上昇、AI-P 上昇、肝腫大</u>
腎臓・泌尿器	尿酸上昇、 <u>クレアチニン上昇、BUN 上昇、尿糖、頻尿</u>	腎臓・泌尿器	尿酸上昇、 <u>クレアチニン上昇、BUN 上昇、尿糖</u>
変更なし		省略	

____部：今回追加改訂箇所
以上