

適正使用のために重要な情報です。ぜひお読み下さい。

先生

全 星 薬 品 株 式 会 社
全 星 薬 品 工 業 株 式 会 社

レボフロキサシン錠100mg「ZE」 「使用上の注意」改訂のお知らせ

謹啓 時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。

平素は当社製品に格別のお引き立てを賜り有難うございます。厚く御礼申し上げます。

さて、この度レボフロキサシン水和物製剤『レボフロキサシン錠 100mg「ZE」』につきまして平成 25 年 11 月 26 日付厚生労働省医薬食品局安全対策課長通知（薬食安発 1126 第 1 号）及び自主改訂に基づき添付文書「使用上の注意」を改訂することになりましたのでお知らせ致します。

ご使用に際しましては下記記載の追加改訂箇所等にご留意頂くようお願い致します。

まずはお知らせ、お願いと共に今後とも倍旧のご高配を賜りますようお願い申し上げます。

ここでお知らせした内容は弊社ホームページ (<http://www.zenseiyakuhin.co.jp>) でもご覧いただけます。

また、「医薬品安全対策情報(Drug Safety Update)」No. 225 号(12 月中旬発送予定)に掲載されます。

謹白

記

| 改訂後 | 改訂前 |
|---|---|
| <p>【使用上の注意】 2. 重要な基本的注意 <u>意識障害等があらわれることがあるので、自動車の運転等、危険を伴う機械の操作に従事する際には注意するよう患者に十分に説明すること。</u></p> <p>4. 副作用 変更なし (1) 重大な副作用(頻度不明) 変更なし 1) ショック、アナフィラキシー(初期症状：紅斑、悪寒、呼吸困難等) 2) ~18) 変更なし</p> | <p>【使用上の注意】</p> <p style="text-align: center;"><<記載なし>></p> <p>3. 副作用 省略 (1) 重大な副作用(頻度不明) 省略 1) ショック、アナフィラキシー様症状(初期症状：紅斑、悪寒、呼吸困難等) 2) ~18) 省略</p> |

_____部：薬食安指示による追加改訂

取り消し線部：自主改訂による削除箇所

以上