

適正使用のために重要な情報です。ぜひお読み下さい。

先生

全 星 薬 品 株 式 会 社
全 星 薬 品 工 業 株 式 会 社

ニフェランタン CR 錠 10 ニフェランタン CR 錠 20 ニフェランタン CR 錠 40 「用法・用量」追加のお知らせ

謹啓 時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。

平素は当社製品に格別のお引き立てを賜り有難うございます。厚く御礼申し上げます。

さて、この度持続性(1日1回型)ニフェジピン製剤『ニフェランタン CR 錠 10・ニフェランタン CR 錠 20・ニフェランタン CR 錠 40』につきまして平成 25 年 10 月 21 日付で下記「用法・用量」追加の一変承認を取得したことを受け、添付文書「用法・用量」を変更しますのでお知らせ致します。

ご使用に際しましては下記記載の追加変更箇所等にご留意頂くようお願い致します。

まずはお知らせ、お願いと共に今後とも倍旧のご高配を賜りますようお願い申し上げます。

ここでお知らせした内容は弊社ホームページ(<http://www.zenseiyakuhin.co.jp>)でもご覧いただけます。

謹白

記

新	旧
【効能・効果】 <ul style="list-style-type: none"> ・ 高血圧症、腎実質性高血圧症、腎血管性高血圧症 ・ 狭心症、異型狭心症 	【効能・効果】 同左
【用法・用量】 <ul style="list-style-type: none"> ・ 高血圧症 通常、成人にはニフェジピンとして20～40mgを1日1回経口投与する。 ただし、1日10～20mgより投与を開始し、必要に応じ漸次増量する。 <u>なお、1日40mgで効果不十分な場合には、1回40mg1日2回まで増量できる。</u> ・ 腎実質性高血圧症、腎血管性高血圧症 通常、成人にはニフェジピンとして20～40mgを1日1回経口投与する。 ただし、1日10～20mgより投与を開始し、必要に応じ漸次増量する。 ・ 狭心症、異型狭心症 通常、成人にはニフェジピンとして40mgを1日1回経口投与する。 なお、症状に応じ適宜増減するが、最高用量は1日1回60mgとする。 	【用法・用量】 <ol style="list-style-type: none"> 1. 高血圧症、腎実質性高血圧症、腎血管性高血圧症： 通常、成人にはニフェジピンとして20～40mgを1日1回経口投与する。ただし、1日10～20mgより投与を開始し、必要に応じ漸次増量する。 2. 狭心症、異型狭心症 通常、成人にはニフェジピンとして40mgを1日1回経口投与する。なお、症状に応じ適宜増減するが、最高用量は1日1回60mgとする。

_____部：今回追加改訂箇所
以上