

適正使用のために重要な情報です。ぜひお読み下さい。

先生

全 星 薬 品 株 式 会 社
全 星 薬 品 工 業 株 式 会 社**バルサルタン錠 20mg「ZE」**
バルサルタン錠 40mg「ZE」
バルサルタン錠 80mg「ZE」
バルサルタン錠 160mg「ZE」
「使用上の注意」改訂のお知らせ

謹啓 時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。

平素は当社製品に格別のお引き立てを賜り有難うございます。厚く御礼申し上げます。

さて、6月20日に新発売しましたバルサルタン製剤『バルサルタン錠 20 mg「ZE」・バルサルタン錠 40 mg「ZE」・バルサルタン錠 80 mg「ZE」・バルサルタン錠 160 mg「ZE」』につきまして平成 26 年 6 月 3 日付厚生労働省医薬食品局安全対策課長通知(薬食安発 0603 第 1 号)に基づき添付文書「使用上の注意」を改訂することになりましたのでお知らせ致します。

ご使用に際しましては下記記載の追加改訂箇所等にご留意頂くようお願い致します。

まずはお知らせ、お願いと共に今後とも倍旧のご高配を賜りますようお願い申し上げます。

ここでお知らせした内容は弊社ホームページ (<http://www.zenseiyakuhin.co.jp>) でもご覧いただけます。

謹白

記

改訂後			改訂前		
【使用上の注意】 3. 相互作用 変更なし			【使用上の注意】 3. 相互作用 省略		
薬剤名等	臨床症状・措置方法	機序・危険因子	薬剤名等	臨床症状・措置方法	機序・危険因子
アリスキレン	変更なし	併用によりレニン-アンジオテンシン系阻害作用が増強される可能性がある。	アリスキレン	省略	併用によりレニン-アンジオテンシン系阻害作用が増強される可能性がある。
<u>アンジオテンシン変換酵素阻害剤</u>	<u>腎機能障害、高カリウム血症及び低血圧をおこすおそれがあるため、腎機能、血清カリウム値及び血圧を十分に観察すること。</u>		<<記載なし>>	<<記載なし>>	
変更なし			省略		

____部：薬食安指示による追加改訂
以上