

日本標準商品分類番号	
872171	
	錠2.5mg
	錠5mg
承認番号	22000AMX01002000
*薬価収載	2012年6月
販売開始	2008年7月

持続性Ca拮抗薬

劇薬 処方せん医薬品注)

日本薬局方

アムロジピンベシル酸塩錠

*アムロジピン錠2.5mg「NikP」

*アムロジピン錠5mg「NikP」



Amlodipine

貯法：室温保存
使用期限：外箱に表示の使用期限内に使用すること。

【禁忌(次の患者には投与しないこと)】

- (1) 妊婦または妊娠している可能性のある婦人(「妊婦、産婦、授乳婦等への投与」の項参照)
- (2) ジヒドロピリジン系化合物に対し過敏症の既往歴のある患者

【組成・性状】

*品名	アムロジピン錠2.5mg「NikP」	アムロジピン錠5mg「NikP」
有効成分	アムロジピンベシル酸塩	
含量	1錠中3.47mg (アムロジピンとして2.5mg)	1錠中6.93mg (アムロジピンとして5mg)
剤形・色調	白色のフィルムコーティング錠	白色の割線入フィルムコーティング錠
外形		
本体コード	N 533	N 534
包装コード	N 533	N 534
添加物	結晶セルロース、無水リン酸水素カルシウム、軽質無水ケイ酸、デンプングリコール酸ナトリウム、ステアリン酸マグネシウム、ヒプロメロース、マクロゴール6000、酸化チタン、タルク、カルナウバロウ	

【効能・効果】

高血圧症、狭心症

〈効能・効果に関連する使用上の注意〉

本剤は効果発現が緩徐であるため、緊急な治療を要する不安定狭心症には効果が期待できない。

【用法・用量】

**・高血圧症

通常、成人にはアムロジピンとして2.5~5mgを1日1回経口投与する。

なお、症状に応じ適宜増減するが、効果不十分な場合には1日1回10mgまで増量することができる。

通常、6歳以上の小児には、アムロジピンとして2.5mgを1日1回経口投与する。

なお、年齢、体重、症状により適宜増減する。

・狭心症

通常、成人にはアムロジピンとして5mgを1日1回経口投与する。

なお、症状に応じ適宜増減する。

**〈用法・用量に関連する使用上の注意〉

6歳以上の小児への投与に際しては、1日5mgを超えないこと。

【使用上の注意】

1. 慎重投与(次の患者には慎重に投与すること)

(1) 過度に血圧の低い患者[さらに血圧が低下するおそれがある。]

(2) 肝機能障害のある患者[本剤は主に肝で代謝されるため、肝機能障害患者では、血中濃度半減期の延長および血中濃度-時間曲線下面積(AUC)が増大することがある。高用量(10mg)において副作用の発現率が高まる可能性があるため、増量時には慎重に投与すること。]

(3) 高齢者(「高齢者への投与」の項参照)

(4) 重篤な腎機能障害のある患者[一般的に腎機能障害のある患者では、降圧に伴い腎機能が低下することがある。]

2. 重要な基本的注意

(1) 降圧作用に基づくめまい等があらわれることがあるので、高所作業、自動車の運転等危険を伴う機械を操作する際には注意させること。

(2) 本剤は血中濃度半減期が長く投与中止後も緩徐な降圧効果が認められるので、本剤投与中止後に他の降圧剤を使用するときは、用量ならびに投与間隔に留意するなど患者の状態を観察しながら慎重に投与すること。

3. 相互作用

本剤の代謝には主として薬物代謝酵素CYP3A4が関与していると考えられている。

併用注意(併用に注意すること)

薬剤名等	臨床症状・措置方法	機序・危険因子
降圧作用を有する薬剤	相互に作用を増強するおそれがある。慎重に観察を行うなど注意して使用すること。	相互に作用を増強するおそれがある。
CYP3A4阻害剤 エリスロマイシン ジルチアゼム リトナビル イトラコナゾール等	エリスロマイシンおよびジルチアゼムとの併用により、本剤の血中濃度が上昇したとの報告がある。	本剤の代謝が競合的に阻害される可能性が考えられる。
CYP3A4誘導剤 リファンピシン等	本剤の血中濃度が低下するおそれがある。	本剤の代謝が促進される可能性が考えられる。
グレープフルーツジュース	本剤の降圧作用が増強されるおそれがある。同時服用をしないように注意すること。	グレープフルーツに含まれる成分が本剤の代謝を阻害し、本剤の血中濃度が上昇する可能性が考えられる。
*シンバスタチン	シンバスタチン80mg(国内未承認の高用量)との併用により、シンバスタチンのAUCが77%上昇したとの報告がある。	機序不明

4. 副作用

本剤は使用成績調査等の副作用発現頻度が明確となる調査を実施していない。

(1) 重大な副作用(頻度不明)

1) 肝機能障害、黄疸: AST(GOT)、ALT(GPT)、 γ -GTPの上昇等を伴う肝機能障害や黄疸があらわれることがあるので、観察を十分に行い、異常が認められた場合には投与を中止し、適切な処置を行うこと。

2) 血小板減少、白血球減少: 血小板減少または白血球減少があらわれることがあるので、検査を行うなど観察を十分に行い、異常が認められた場合には投与を中止し、適切な処置を行うこと。

3) 房室ブロック: 房室ブロック(初期症状: 徐脈、めまい等)があらわれることがあるので、異常が認められた場合には投与を中止し、適切な処置を行うこと。

(2) その他の副作用

次のような副作用が認められた場合には、必要に応じ、減量、投与中止等の適切な処置を行うこと。

	頻度不明
肝臓	ALT(GPT)上昇、AST(GOT)上昇、肝機能障害、Al-P上昇、LDH上昇、 γ -GTP上昇、黄疸、腹水
循環器	浮腫 ^{注1)} 、ほてり(熱感、顔面潮紅等)、動悸、血圧低下、胸痛、期外収縮、洞房または房室ブロック、洞停止、心房細動、失神、徐脈

	頻度不明
精神・神経系	眩暈・ふらつき、頭痛・頭重、眠気、振戦、末梢神経障害、気動揺、不眠
消化器	心窩部痛、便秘、嘔気・嘔吐、口渇、消化不良、下痢・軟便、排便回数増加、口内炎、腹部膨満、胃腸炎、肺炎
筋・骨格系	筋緊張亢進、筋痙攣、背痛、関節痛、筋肉痛
泌尿・生殖器	BUN上昇、クレアチニン上昇、頻尿・夜間頻尿、尿管結石、尿潜血陽性、尿中蛋白陽性、勃起障害、排尿障害
代謝異常	血清コレステロール上昇、CK(CPK)上昇、高血糖、糖尿病、尿中ブドウ糖陽性
血液	赤血球減少、ヘモグロビン減少、白血球減少、白血球増加、紫斑、血小板減少
過敏症 ^{注2)}	発疹、痒疹、蕁麻疹、光線過敏症、多形紅斑、血管炎、血管浮腫
口腔 ^{注2)}	(連用により)歯肉肥厚
その他	全身倦怠感、しびれ、脱力感、耳鳴、鼻出血、味覚異常、疲労、咳、発熱、視力異常、呼吸困難、異常感覚、多汗、血中カリウム減少、女性化乳房、脱毛、鼻炎、体重増加、体重減少、疼痛、皮膚変色

注1) 10mgへの増量により高頻度に認められたとの報告がある。

注2) 発現した場合には投与を中止すること。

5. 高齢者への投与

高齢者では一般に過度の降圧は好ましくないとされていることおよび高齢者での体内動態試験で血中濃度が高く、血中濃度半減期が長くなる傾向が認められているので、低用量(2.5mg/日)から投与を開始するなど患者の状態を観察しながら慎重に投与すること。

6. 妊婦、産婦、授乳婦等への投与

(1)妊婦または妊娠している可能性のある婦人には投与しないこと。[動物実験で妊娠末期に投与すると妊娠期間および分娩時間が延長することが認められている。]

(2)授乳中の婦人への投与は避けることが望ましいが、やむを得ず投与する場合は、授乳を避けさせること。[動物実験で母乳中へ移行することが認められている。]

** 7. 小児等への投与

低出生体重児、新生児、乳児または6歳未満の幼児に対する安全性は確立していない(使用経験が少ない)。

8. 過量投与

(1)症 状：過度の末梢血管拡張により、ショックを含む著しい血圧低下と反射性頻脈を起こすことがある。

(2)処 置：心・呼吸機能のモニターを行い、頻回に血圧を測定する。著しい血圧低下が認められた場合は、四肢の挙上、輸液の投与等、心血管系に対する処置を行う。症状が改善しない場合は、循環血液量および排尿量に注意しながら昇圧剤の投与を考慮する。本剤は蛋白結合率が高いため、透析による除去は有効ではない。

また、本剤服用直後に活性炭を投与した場合、本剤のAUCは99%減少し、服用2時間後では49%減少したことから、本剤過量投与時の吸収抑制処置として活性炭投与が有効であると報告されている。

9. 適用上の注意

(1)分割後：分割後は早めに使用すること。分割後に使用する場合には、遮光の上30日以内に使用すること。

(2)薬剤交付時：PTP包装の薬剤はPTPシートから取り出して服用するよう指導すること(PTPシートの誤飲により、硬い鋭角部が食道粘膜へ刺入し、更には穿孔を起こして縦隔洞炎等の重篤な合併症を併発することが報告されている)。

10. その他の注意

因果関係は明らかでないが、本剤による治療中に心筋梗塞や不整脈(心室性頻拍を含む)がみられたとの報告がある。

【薬物動態】


1. 生物学的同等性試験

(1)アムロジピン錠2.5mg「NikP」

アムロジピン錠2.5mg「NikP」と標準製剤を、クロスオーバー法によりそれぞれ1錠(アムロジピンとして2.5mg)健康成人男子に絶食単回経口投与して血漿中アムロジピン濃度を測定し、得られた薬物動態パラメータ(AUC、Cmax)について統計解析を行った結果、両剤の生物学的同等性が確認された。¹⁾

	判定パラメータ		参考パラメータ	
	AUC ₀₋₇₂ (ng·h/mL)	C _{max} (ng/mL)	T _{max} (h)	t _{1/2} (h)
アムロジピン錠 2.5mg「NikP」	44.32±8.52	1.44±0.33	7.4±2.1	36.63±6.32
標準製剤 (錠剤、2.5mg)	44.52±8.84	1.40±0.33	6.6±1.0	36.58±6.03

(Mean±S.D., n=10)




血漿中濃度ならびにAUC、Cmax等のパラメータは、被験者の選択、体液の採取回数・時間等の試験条件によって異なる可能性がある。

(2)アムロジピン錠5mg「NikP」

アムロジピン錠5mg「NikP」と標準製剤を、クロスオーバー法によりそれぞれ1錠(アムロジピンとして5mg)健康成人男子に絶食単回経口投与して血漿中アムロジピン濃度を測定し、得られた薬物動態パラメータ(AUC、Cmax)について統計解析を行った結果、両剤の生物学的同等性が確認された。²⁾

	判定パラメータ		参考パラメータ	
	AUC ₀₋₇₂ (ng·h/mL)	C _{max} (ng/mL)	T _{max} (h)	t _{1/2} (h)
アムロジピン錠 5mg「NikP」	88.1±21.8	2.67±0.60	6.5±1.0	41.7±11.8
標準製剤 (錠剤、5mg)	86.2±24.3	2.69±0.63	6.5±0.7	39.4±10.8

(Mean±S.D., n=20)



血漿中濃度ならびにAUC、Cmax等のパラメータは、被験者の選択、体液の採取回数・時間等の試験条件によって異なる可能性がある。

2. 溶出挙動

アムロジピン錠2.5mg「NikP」およびアムロジピン錠5mg「NikP」は、日本薬局方外医薬品規格第3部に定められたアムロジピンベシル酸塩錠の溶出規格に適合することが確認されている。^{3) 4)}


【有効成分に関する理化学的知見】

アムロジピンベシル酸塩は白色～帯黄白色の結晶性の粉末である。

メタノールに溶けやすく、エタノール(99.5)にやや溶けにくく、水に溶けにくい。

メタノール溶液(1→100)は旋光性を示さない。

融点：約198℃(分解)



一般名：アムロジピンベシル酸塩(Amlodipine Besilate)(JAN)

化学名：3-Ethyl 5-methyl (4*RS*)-2-[(2-aminoethoxy)methyl]-4-(2-chlorophenyl)-6-methyl-1,4-dihydropyridine-3,5-dicarboxylate monobenzenesulfonate

分子式：C₂₀H₂₅ClN₂O₅・C₆H₆O₃S

分子量：567.05

【取扱い上の注意】

安定性試験

本品につき加速試験(40℃、相対湿度75%、6ヵ月)を行った結果、アムロジピン錠2.5mg「NikP」およびアムロジピン錠5mg「NikP」は通常の市場流通下で3年間安定であることが推測された。^{5) 6)}

【包装】

アムロジピン錠2.5mg「NikP」

- 100錠(10錠×10; PTP)
- 140錠(14錠×10; PTP)
- 500錠(10錠×50; PTP)
- 500錠(バラ)
- 700錠(14錠×50; PTP)

アムロジピン錠5mg「NikP」

- 100錠(10錠×10; PTP)
- 140錠(14錠×10; PTP)
- 500錠(10錠×50; PTP)
- 500錠(バラ)
- 700錠(14錠×50; PTP)

【主要文献及び文献請求先】

主要文献

- 1) 日医工ファーマ社内資料(2.5mg:生物学的同等性試験)
- 2) 日医工ファーマ社内資料(5mg:生物学的同等性試験)
- 3) 日医工ファーマ社内資料(2.5mg:溶出試験)
- 4) 日医工ファーマ社内資料(5mg:溶出試験)
- 5) 日医工ファーマ社内資料(2.5mg:安定性試験)
- 6) 日医工ファーマ社内資料(5mg:安定性試験)

文献請求先

主要文献欄に記載の文献・社内資料は下記にご請求下さい。

全星薬品工業株式会社 医薬情報部
〒590-0024 堺市堺区向陵中町2-4-12

☎ 0120-189-228

TEL 072-250-6651

FAX 072-250-4646

販売元

 **全星薬品株式会社**
堺市堺区向陵中町2-4-12

発売元

 **全星薬品工業株式会社**
堺市堺区向陵中町2-4-12

 製造販売元
日医工ファーマ株式会社
NICHIKO PHARMA 富山市総曲輪1丁目6番21